

UN 1219 Klasa ADR 3 Grupa pakowania II

TELEFONY ALARMOWE: 998 PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
999 POGOTOWIE RATUNKOWE, 997 POLICJA LUB 112

UFI: Y600-Y00U-PO0N-4JNF.

H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary. **H319** – Działa drażniąco na oczy. **H336** – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. **P260**: Nie wdychać par rozpylonej cieczy. **P210**: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzeń/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. **P305 + P351 + P338**: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P304 + P340**: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.



Niebezpieczeństwo

UMD741



5 908248 1141774

Data ważności i numer serii podane są na etykiecie wymiennego **wkładu UMD540**.
NR POZWOLENIA NA OBRÓT: 9117/23

PRODUCENT/PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:
P.H.P.U. TRANSVET Sp. z o.o.
ul. Aleja Wolności 10/32, 62-800 Kalisz
tel./fax: 62 767 3015
DYSTRYBUTOR:
MERIDA Sp. z o.o.
Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
tel.: 71 33 97 888

Włókna jest produktem całkowicie naturalnym biodegradowalnym i kompostowalnym. Można utylizować z odpadami typu BIO. Skład włókniny: 100% bawełna.



POLANA DDR+



CHUSTECZKI DO DEZYNFEKCYJ RĄK I POWIERZCHNI

PRZEZNACZENIE PRODUKTU BIOBÓJCZEGO: CHUSTECZKI NASĄCZONE PŁYNEM DO HIGIENICZNEJ I CHIRURGICZNEJ DEZYNFEKCYJ RĄK O DZIAŁANIU GRZYBOBÓJCZYM, BAKTERIOBÓJCZYM I BÓJCZYM WOBEC WIRUSÓW OSŁONKOWYCH HSV-1 ORAZ DO DEZYNFEKCYJ POWIERZCHNI MAJĄCYCH I NIEMAJĄCYCH KONTAKTU Z ŻYWNOSCIĄ O DZIAŁANIU BAKTERIOBÓJCZYM, BÓJCZYM NA GRZYBY DROŹDZOPODOBNE ORAZ BÓJCZYM WOBEC WIRUSÓW HSV-1. DO STOSOWANIA W MIEJSCACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, OBSZARZE SPOŻYWCZYM, PRZEMYSŁOWYM I MEDYCZNYM.

O DZIAŁANIU WIRUSOBÓJCZYM, BAKTERIOBÓJCZYM I GRZYBOBÓJCZYM

Postać produktu: chusteczka nasączona płynem. **Rodzaj użytkownika:** dla użytkownika profesjonalnego. **Substancja czynna:** Etanol 28g/100g płynu, propan-2-ol 36g/100g płynu, 2-fenoksietanol 0,5g/100g płynu. **Dawkowanie:** Produkt gotowy do użycia. **Warunki bezpieczeństwa:** przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny dotyczących pracy z chemikaliami oraz instrukcji stanowiskowych. Podczas stosowania produktu nie jeść, nie palić, unikać bezpośredniego kontaktu preparatu z oczami. Preparat stosować w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. **Wentylacja pomieszczeń:** wentylować do momentu zaniku charakterystycznego zapachu. **Warunki przechowywania:** Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w pozycji stojącej, z dala od otwartego ognia, w temperaturze powyżej 0°C. **Pierwsza pomoc: Przy kontakcie ze skórą:** w razie długotrwałego kontaktu ze skórą, umyć ciało wodą z mydłem. **Przy kontakcie z oczami:** przemywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut przy szeroko otwartej powiece, niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską. **Przy spożyciu:** przepłukać usta wodą, podać osobie poszkodowanej duże ilości wody do picia, nie wywoływać wymiotów, nie podawać środków zobojętniających, wezwać pomoc lekarską. **Przy wdychaniu:** w razie zatrucia inhalacyjnego wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia, zapewnić dopływ świeżego powietrza, niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską. **Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania produktu:** W przypadku użycia preparatu niezgodnie z zaleceniami zamieszczonymi na etykiecie mogą wystąpić objawy: podrażnienia oczu, uczucie senności lub zawroty głowy. **Postępowanie z odpadami:** Opakowania jeżeli nie są uszkodzone po przeplukaniu można wykorzystać ponownie.

STOSOWANIE:

Dezynfekcja rąk: nasączoną chusteczką przetrzeć czyste i suche dłonie.

Chirurgiczna dezynfekcja rąk: czas kontaktu 180 sekund (wg normy EN 12791).

Higieniczna dezynfekcja rąk: czas kontaktu 30 sekund (wg normy EN 1500).

Dezynfekcja rąk działanie bakteriobójcze: czas kontaktu 60 sekund (wg normy EN 13727).

Dezynfekcja rąk działanie grzybobójcze: czas kontaktu 60 sekund (wg normy EN 13624).

W przypadku zwalczania wirusa HSV-1 czas kontaktu dla higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk wynosi 5 minut (wg normy EN 14476).

Dezynfekcja powierzchni: czystą powierzchnię przetrzeć nasączoną chusteczką.

Powierzchnie mające styczność z żywnością po dezynfekcji spłukać wodą o jakości pitnej.

Dezynfekcja powierzchni działanie bakteriobójcze: czas kontaktu 60 sekund (EN 16615).

Dezynfekcja powierzchni działanie bójcze na grzyby drożdżopodobne: czas kontaktu 60 sekund (wg normy EN 16615).

W przypadku zwalczania wirusa HSV-1 czas kontaktu wynosi 5 minut (EN 14476).


Ręce i powierzchnie powinny pozostać wilgotne przez cały czas kontaktu.

Wyłącznie nasączone chusteczki spełniają przeznaczenie produktu. Sucha chusteczka nie dezynfekuje.

Tubę użyj ponownie dokupując sam wkład UMD540

PRODUKT GOTOWY DO UŻYCIA

100 x 15 x 15 cm



SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 1. Zdejmij pokrywę tuby i otwórz opakowanie z chusteczkami w miejscu nacięcia na worku. 2. Rolkę w foliowym opakowaniu umieść w tubie, by chusteczki dłużej utrzymywały poziom nasączenia płynem dezynfekującym. 3. Wyciągnij pierwszą chusteczkę ze środka rolki i przełóż ją przez otwór dozujący w pokrywie. Zapewni to łatwe dozowanie i zrywanie włókniny na perforacji. 4. Zamknij szczelnie pokrywę.

UŻYCIE: 1. Otwórz korek tuby i pobierz odpowiednią ilość chusteczek. Aby zerwać listek na perforacji należy pociągnąć włókninę w bok, zahaczając na wysokości perforacji o krawędzie otworu dozującego. Wyciąganie włókniny prosto w górę z dozownika pozwala na pobranie dłuższego fragmentu włókniny. 2. Po pobraniu odpowiedniej ilości chusteczek, zamknij szczelnie korek dozujący. 3. Przecieraj dezynfekowane miejsce do momentu jednolitego pokrycia powierzchni przez płyn, którym nasączona jest chusteczka. Chusteczki mogą pozostawiać smugi na gładkich i połyskujących powierzchniach takich jak: polerowana stal, lustra, szyby itp. 4. Nie splukuj. Poczekaj do odparowania/wyschnięcia.

Uwagi: Produkt przechowywać szczelnie zamknięty. W przypadku wyschnięcia chusteczka nie nadaje się do dezynfekcji. Dezynfekowana powierzchnia powinna być umyta i sucha. W przypadku długotrwałej dezynfekcji powierzchni za pomocą chusteczek DDR+ zastosuj rękawice ochronne.